

VACCINATION

ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE

POUR EN FINIR AVEC CES MALADIES, FAITES VACCINER VOTRE ENFANT

5 BONNES RAISONS POUR FAIRE VACCINER VOTRE ENFANT CONTRE LA ROUGEOLE, LES OREILLONS ET LA RUBÉOLE (ROR)

C'EST EFFICACE

Le vaccin ROR permet à votre enfant d'éviter ces 3 maladies très contagieuses qui n'ont pas de traitement spécifique.

C'EST NÉCESSAIRE

Vacciner votre enfant, c'est nécessaire pour lui mais aussi pour les autres. Si tout le monde est vacciné, ces maladies disparaîtront.

C'EST SIMPLE

En seulement 2 injections, le vaccin ROR protège votre enfant contre 3 maladies.

C'EST SANS DANGER

Le vaccin ROR est bien toléré et ne fragilise pas votre enfant.

C'EST GRATUIT

Actuellement, l'Assurance maladie prend totalement en charge le vaccin ROR pour tous les enfants de 1 à 13 ans. La gratuité du vaccin sera prochainement étendue jusqu'à 18 ans.



Document réalisé dans le cadre du Plan d'élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France (2005-2010).



La rougeole, les oreillons et la rubéole sont trois maladies très contagieuses considérées comme banales mais qui peuvent entraîner de graves complications. La vaccination est le seul moyen de lutter efficacement contre ces maladies. C'est pourquoi il faut vacciner tous les enfants et les adolescents.

LA ROUGEOLE, LA RUBÉOLE ET LES OREILLONS 3 MALADIES TRÈS CONTAGIEUSES

Les virus de ces maladies se transmettent très facilement d'une personne à l'autre par l'éternuement ou la toux. Une personne contaminée est contagieuse sans le savoir, avant même de se sentir malade. Ces maladies sont si contagieuses qu'en l'absence de vaccination, pratiquement tout le monde les attraperait un jour ou l'autre. Or, ces maladies peuvent être plus graves que l'on croit.

LA ROUGEOLE, LA RUBÉOLE ET LES OREILLONS : 3 MALADIES AUX CONSÉQUENCES PARFOIS GRAVES

LA ROUGEOLE : UNE MALADIE ÉPROUVANTE POUR L'ENFANT

- La rougeole provoque une éruption de boutons, de la toux, de la fièvre, une conjonctivite (yeux rouges), et surtout une atteinte de l'état général (grande fatigue) qui va affaiblir votre enfant pendant plusieurs semaines.
- Elle peut être plus grave chez les nourrissons ainsi que chez les adolescents et les adultes et provoquer des pneumonies, des convulsions, des encéphalites entraînant des dommages permanents au cerveau voire le décès.

LES OREILLONS : DES RISQUES PLUS IMPORTANTS CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES

- Les oreillons provoquent de la fièvre, des maux de tête, un gonflement des glandes salivaires.
- Ils peuvent entraîner des complications graves : méningites, surdit , st rilit .

LA RUB OLE : UN VRAI DANGER POUR LA FEMME ENCEINTE

- La rub ole provoque une  ruption de boutons, des ganglions, des douleurs articulaires (surtout chez les femmes).
- Elle passe souvent inaper ue. Cependant, elle peut  tre dangereuse si elle survient chez une femme enceinte. Elle peut alors occasionner de graves malformations chez le futur b b  : atteinte du cerveau, des yeux, surdit  et l sions cardiaques. Chaque ann e, la rub ole conduit   des interruptions m dicales de grossesse.

C'est pourquoi, il est essentiel que toutes les jeunes femmes soient vaccin es.

- Par ailleurs, la vaccination des tout petits prot ge  galement les femmes enceintes qui n'auraient pas  t  vaccin es.

PAROLE D'EXPERT

Professeur Daniel Floret, pr sident du Comit  technique des vaccinations

Depuis 2008, le nombre de cas de rougeole a augment  en France. Le virus circule presque partout sous forme de petites  pid mies. Les cas sont caract ris s par leur gravit  (1 cas sur 5 m ne   l'hospitalisation) et l' ge  lev  des personnes atteintes (13 ans en moyenne). Celles-ci n' taient pas vaccin es ou n'avaient re u qu'une seule dose de vaccin.

COMMENT  A MARCHE ?

2 doses de vaccin ROR (Rougeole, Oreillons, Rub ole) sont n cessaires chez l'enfant pour qu'il soit efficace.

QUAND FAIRE VACCINER VOTRE ENFANT ? (Source : Calendrier vaccinal)

- 1^{re} injection   12 mois (d s 9 mois si entr e en collectivit ).
- 2^e injection entre 13 et 24 mois (entre 12 et 15 mois si premi re dose   9 mois).

L'injection peut  tre pratiqu e le m me jour que d'autres vaccins.

Si votre enfant ou votre adolescent n'est pas   jour de sa vaccination, un rattrapage est fortement recommand . Parlez-en   votre m decin.

RATTRAPAGE

- Enfants non vaccin s : 2 doses pour les enfants n s en 1992 ou apr s.
- Adolescents et adultes non vaccin s :
 - > 1 dose de vaccin ROR pour les personnes n es entre 1980 et 1991 non vaccin es contre la rougeole.
 - > 1 dose de vaccin ROR pour les personnes n es avant 1980 expos es au risque de rougeole (par leur m tier notamment).

O  FAIRE VACCINER VOTRE ENFANT ?

Pour faire vacciner votre enfant, adressez-vous au m decin de votre choix.

Ce peut  tre votre m decin traitant, le p diatre de votre enfant ou un m decin d'un centre de Protection maternelle et infantile (PMI).

